表1. 推奨菌種と抗菌薬

菌グループ	菌名	作成の推奨度	PCG	ABPC	AMPC	ABPC/SBT	AMPC/CVA	PIPC/TAZ	CEZ	CTX	CAZ	CFPM	CMZ	IPM	MEPM	AZT	MPIPC	GM	TOB	AMK	CPFX	LVFX	TC	TGC	VCM	TEIC	DAP	LZD	EM	CAM	AZM	MINO	ST(注4)	CLDM	RFP	FOM	CL	MNZ	FLCZ	VRCZ	MCFG	CPFG	AMPH-B
Staphylococci	*Staphylococcus aureus* (MSSA)	◎	N	N	N				A(注3)							R	A	B				B			A		B	B				B	B	B	B		R						
	Staphylococcus aureus (MRSA)	◎	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	B				B			A		B	B				B	B	B	B		R						
	Coagulase-negative Staphylococci	○							A(注3)							R	A	B				B			A		B	B				B	B	B	B		R						
Streptococci	*Streptococcus pneumoniae*	◎	A(注1,2)		B					B(注1)		B(注1)		B	B	R						B			B				A					B			R						
	Streptococcus pyogenes (beta-Hemolytic group)	△	A	A						A		B				R						B			B				A					B			R						
	Streptococcus agalactiae (beta-Hemolytic group)	△	A	A						A		B				R						B			B				A					B			R						
	Viridans group Streptococci (血液・髄液のみ)	△	A	A						A		B				R						B			B				A					B			R						
Enterococci	*Enterococcus* spp.	◎	A	A					R	R	R	R	R			R		R	R	R	N	N			A		B	B					R	R			R						
	Enterococcus faecalis	○	A	A					R	R	R	R	R			R		R	R	R	N	N			A		B	B					R	R			R						
	Enterococcus faecium	○	A	A					R	R	R	R	R			R		R	R	R	N	N			A		B	B					R	R			R						
腸内細菌科細菌	*Escherichia coli*	◎		A		B	B	B	A	A	B	B	A	A	A			A	B	A	A*	A*			R	R		R	R	R	R		A	R	R								
	Escherichia coli (ESBLまたはCTX/CTRX非感性)	○		A		B	B	B	A	A	B	B	A	A	A			A	B	A	A*	A*			R	R		R	R	R	R		A	R	R								
	Klebsiella oxytoca	△		R		B	B	B	A	A	B	B	A	A	A			A	B	A	A*	A*			R	R		R	R	R	R		B	R	R								
	Klebsiella pneumoniae	◎		R		B	B	B	A	A	B	B	A	A	A			A	B	A	A*	A*			R	R		R	R	R	R		B	R	R								
	Enterobacter cloacae complex	○		R		R	R	B	R	A	B	B	R	A	A			A	B	A	A*	A*			R	R		R	R	R	R		B	R	R								
	Morganella morganii	△		R		R	R	B	R	A	B	B	R	A	A			A	B	A	A*	A*	R	R	R	R		R	R	R	R	R	B	R	R		R						
	Proteus mirabilis	△		A		B	B	B	A	A	B	B	A	A	A			A	B	A	A*	A*	R	R	R	R		R	R	R	R	R	B	R	R		R						
	Citrobacter freundii complex	△		R		R	R	B	R	A	B	B	R	A	A			A	B	A	A*	A*			R	R		R	R	R	R		B	R	R								
	Serratia marcescens	△		R		R	R	B	R	A	B	B	R	A	A			A	B	A	A*	A*			R	R		R	R	R	R		B	R	R		R						
ブドウ糖非発酵グラム陰性	*Acinetobacter* spp.	△		R		B	R	A	R	B	A	B	R	A	A	R		B	B	A	A*	A*			R	R	R	R	R	R	R		B	R	R	R							
	Pseudomonas aeruginosa	◎		R		R	R	A	R	R	A	B	R	A	A	B		B	B	A	A*	A*	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R							
	Stenotrophomonas maltophilia	△		R		R	R	R	R	R			R	R	R	R		R	R	R		A	R		R	R	R	R	R	R	R	A	A	R	R	R							
その他グラム陰性桿菌	*Haemophilus influenzae*	○		A		A	B			A				B	B						B*	B*								B	B												
偏性嫌気性菌	*Bacteroides fragilis* group	△				A	B	A					A	A	A																			A				A					
真菌	*Candida* spp.	△																																					A	B	A		

薬剤についてのコメント

CTRXで代用可能

*: CPFX または LVFXのいずれか

表中の記号・アルファベットの意味

◎: 必ず作成
○: 作成を推奨
△: 作成を考慮

A: 必ず作成
B: 作成を推奨
N: 作成しないことを推奨
（作成したアンチバイオグラムでは[－]と表示する）
R: 自然耐性

注1：非髄膜炎ブレイクポイントで集計した数値は必ず作成する。髄膜炎ブレイクポイントで集計した数値も別の行または表外に示すことを推奨する。CLSIはすべての肺炎球菌分離株について非髄膜炎/髄膜炎基準で算出することとしている。
注2：静注用のブレイクポイントを用いる（A）。経口用のブレイクポイントを用いた数値は脚注として表示してもよい。
注3：CEZに対する感受性検査の有無にかかわらず、MPIPC感性ブドウ球菌はCEZ感性とする。
注4：施設により測定MICの表記が異なる可能性があり、判定時に注意を要する。